


Thème : optimisation

L'exercice

On considère le cercle Γ de diamètre $[RS]$ et de centre A avec $RS = 2$. Pour tout point M de $[AS]$, on trace la perpendiculaire à (RS) passant par M qui coupe le cercle en B et C . Existe-t-il une position du point M pour laquelle l'aire du triangle ABC est maximale ?



D'après manuel MATH'x première S, Didier

Les réponses de trois élèves de première S

Élève 1

On note x la longueur AM , on a $BC = 2x$.

J'en déduis l'aire du triangle ABC qui vaut $\frac{x \times 2x}{2} = x^2$.

Donc, l'aire du triangle ABC est maximale lorsque x^2 est le plus grand possible, c'est-à-dire lorsque $x = 1$ quand le point M est en S .

Élève 2

Le triangle AMB est rectangle en M donc d'après Pythagore, $AB^2 = AM^2 + MB^2$.

donc $MB^2 = AB^2 - AM^2 = x^2 - 1$. J'en déduis que $MB = \sqrt{x^2 - 1}$.

Je note $f(x)$ l'aire cherchée, on a $f(x) = \frac{x\sqrt{x^2 - 1}}{2}$.

J'ai tracé la courbe de la fonction sur ma calculatrice, mais cela n'a rien donné.

Élève 3

Je note $\theta = \widehat{MAB}$ et $f(\theta)$ l'aire du triangle ABC .

On a : $f(\theta) = \frac{AM \cdot BC}{2} = \frac{\cos(\theta) \cdot 2 \sin(\theta)}{2} = \cos(\theta) \sin(\theta)$.

Comme $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$ et $-1 \leq \sin(\theta) \leq 1$, on a $f(\theta) \leq 2$.

Il existe donc bien une position du point M pour laquelle l'aire du triangle ABC est maximale, cette aire vaut 2.

Le travail à exposer devant le jury

- 1 - Analysez la démarche de chaque élève en mettant en évidence ses réussites et ses erreurs éventuelles.
- 2 - Présentez une correction de cet exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de première S.
- 3 - Proposez deux exercices sur le thème de l'optimisation, dont l'un devra illustrer l'apport d'un logiciel dans sa résolution.