

## Algèbre et Géométrie 1

### Feuille d'exercices d'algèbre n°3

### *Produit scalaire et espaces euclidiens*

#### Révisions

- 1) Rappeler ce qu'est un *produit scalaire*. Qu'appelle-t-on *espace euclidien* ?
- 2) Énoncer et démontrer l'*inégalité de Cauchy-Schwarz*. Traiter le cas d'égalité.  
En déduire que l'application  $x \mapsto \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$  est une norme.
- 3) Rappeler la *formule de polarisation* (lien avec la norme) et l'*identité du parallélogramme*.
- 4) Soit  $E$  un espace euclidien.
  - Donner la définition de l'*orthogonal* (noté  $A^\perp$ ) d'une partie  $A$  de  $E$ . Montrer que  $A^\perp$  est toujours un sous-espace vectoriel de  $E$ .  
Démontrer qu'un sous-espace vectoriel et son orthogonal sont toujours supplémentaires dans  $E$ .
  - Quand dit-on qu'une famille  $(e_1, \dots, e_k)$  de vecteurs de  $E$  est *orthogonale* (resp. *orthonormée*) ?  
Montrer que toute famille orthogonale de vecteurs non nuls de  $E$  est libre.

#### Exercice n°1

Pour quelles valeurs  $\lambda \in \mathbb{R}$  les formes bilinéaires sur  $\mathbb{R}^3$  ci-dessous définissent-elles un produit scalaire ?

- 1)  $a(x, y) = x_1y_1 + 6x_2y_2 + 3x_3y_3 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1 + 3\lambda x_1y_3 + 3\lambda x_3y_1$
- 2)  $b(x, y) = 2x_1y_1 + 7x_1y_2 + 7x_2y_1 + 6x_2y_2 - 3x_3y_3 + \lambda x_2y_3 + \lambda x_3y_2$

#### Exercice n°2 (CAPES 2011 - Première composition)

Pour tous  $P$  et  $Q$  appartenant à  $\mathbb{R}[X]$ , on pose :  $\varphi(P, Q) = \langle P, Q \rangle = \int_0^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x} dx$ .  
Montrer que l'application  $\varphi$  est bien définie. Montrer que  $\varphi$  est un produit scalaire.

#### Exercice n°3

Soit  $(e_1, \dots, e_p)$  une famille de  $p$  vecteurs unitaires d'un espace euclidien  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  de dimension  $n$ . Le but de cet exercice est de montrer que  $(e_1, \dots, e_p)$  est une base orthonormée de  $E$  si et seulement si, pour tout  $x \in E$ ,  $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle^2$ .

- 1) Montrer que toute base orthonormée  $(e_1, \dots, e_p)$  de  $E$  vérifie bien cette propriété.
- 2) Montrer que si la famille  $(e_1, \dots, e_p)$  vérifie cette propriété, elle est orthonormée.
- 3) Montrer que si la famille  $(e_1, \dots, e_p)$  vérifie cette propriété, elle engendre  $E$  (on pourra poser  $y = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$  et calculer  $\|x - y\|^2$ ).

#### Exercice n°4

Soit  $f$  une forme linéaire d'un espace euclidien  $E$ . Montrer que :  $\exists u \in E \quad \forall x \in E \quad f(x) = \langle x, u \rangle$ .

**Exercice n°5**

Soient  $E$  un espace euclidien de dimension  $n$  sur  $\mathbb{R}$ ,  $F$  un s.e.v. de dimension  $p$  et  $x \in E$ . Montrer l'existence et l'unicité de  $y \in F$  tel que  $\|x - y\|$  soit minimum. Dans une base convenablement choisie, exprimer  $y$  en fonction de  $x$ . Traduire le résultat en termes de distance.

Application : Trouver  $a$  et  $b$  tel que  $\int_0^1 (\ell n x - ax - b)^2 dx$  soit minimum. Calculer ce minimum.

**Exercice n°6** (Méthodes des moindres carrés)

Deux valeurs physiques sont liées par une relation  $y = ax + b$ . On veut trouver  $a$  et  $b$ . On fait  $n$  expériences de résultats  $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$ . Montrer qu'on peut trouver  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  tels que  $\sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$  soit minimum. Déterminer  $a$  et  $b$ .

**Exercice n°7** (Polynômes de Legendre).

Soit  $E = \mathbb{R}[X]$  muni du produit scalaire  $\varphi : E^2 \rightarrow \mathbb{R}, (f, g) \mapsto \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$ .

1) Pour  $n \geq 1$ , on pose  $P_n = (X^2 - 1)^n$  et  $Q_n = \frac{d^n}{dX^n}(P_n)$ .

a) Quels sont le degré et le coefficient dominant de  $Q_n$ ? Montrer que :  $\forall 0 \leq p \leq n - 1, \varphi(X^p, Q_n) = 0$ .

b) Montrer que les polynômes  $L_n = \frac{1}{2^n \cdot n!} Q_n$  forment une base orthogonale de  $E$ .

2) Soit  $s : E \rightarrow E, P \mapsto s(P) = Q$  où  $Q(X) = P(-X)$ . Montrer que  $s$  est une symétrie orthogonale.

**Exercice n°8**

Soit  $E$  un espace euclidien. Soit  $p$  un endomorphisme de  $E$  tel que  $p \circ p = p$ . Montrer que  $p$  est un projecteur orthogonal si et seulement si  $p$  est **symétrique** (c'est à dire  $\forall (x, y) \in E^2 \quad \langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle$ ). Comment cela se traduit-il matriciellement ?

**Exercice n°9**

Soit  $E$  un espace euclidien. Soit  $s$  un endomorphisme de  $E$ , distinct de  $\pm id_E$ , tel que  $s \circ s = id_E$ . Montrer que  $s$  est une symétrie orthogonale si et seulement si  $s$  est symétrique. Comment cela se traduit-il matriciellement ?

Montrer que si  $s$  est une symétrie orthogonale alors  $s$  conserve le produit scalaire (on dit alors que  $s$  est un **endomorphisme orthogonal** de  $E$ ) :  $\forall (x, y) \in E^2 \quad \langle s(x), s(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ .

**Exercice n°10**

Soit  $f$  un endomorphisme orthogonal d'un espace euclidien.

1) Comment cela se traduit-il matriciellement ? Montrer que  $f$  est bijectif et que  $\det f = \pm 1$ .

2) Montrer que  $\text{Ker}(f - Id) = \text{Im}(f - Id)^\perp$ . En déduire que si  $(f - Id)^2 = 0$ , alors  $f = Id$ .

**Exercice n°11**

On considère l'endomorphisme  $f$  de  $\mathbb{R}^3$  dont la matrice dans la base canonique est :

$$M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -2 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

1) Calculer  $M^2$ . Que peut-on dire des valeurs propres de  $M$ ? La matrice  $M$  est-elle diagonalisable ?

2) Montrer que les sous-espaces propres sont orthogonaux puis caractériser géométriquement  $f$ . On précisera les points, droites ou plans définissant la transformation.