

Algèbre et Géométrie 2

Feuille d'exercices de géométrie n°2

Similitudes


Révisions n°1

- Démontrer que toute similitude du plan de rapport $k \neq 1$ admet un unique point fixe Ω et s'écrit de manière unique sous la forme $f = h_{\Omega,k} \circ g$ où g est une isométrie commutant avec l'homothétie $h_{\Omega,k}$.
- Rappeler les principales propriétés des similitudes planes.

Exercice n°1

$ABCD$ est un carré direct du plan orienté. M est un point de (DC) . La perpendiculaire à (AM) passant par A coupe (BC) en N et I est le milieu de $[MN]$.


- 1) Montrer que le triangle rectangle AMN est isocèle.
- 2) Montrer que I est l'image de M par une similitude fixe.
- 3) Quel est l'ensemble décrit par le point I lorsque M décrit (DC) ?



Exercice n°2

Le plan est orienté. Soit A , B et C trois points non alignés tels que ABC est un triangle direct. On désigne respectivement par D et E les points tels que les triangles ACE et ADB sont directs, rectangles et isocèles en A . Le point O est le milieu de $[BC]$.

- 1) Construire le point F , symétrique du point C par rapport à A .
- 2) En utilisant une rotation de centre A et une homothétie de centre C , montrer que les droites (AO) et (DE) sont perpendiculaires et que $DE = 2AO$.



Exercice n°3 (Épreuve sur dossier 2006)

On considère deux droites parallèles \mathcal{D}_1 et \mathcal{D}_2 et un point A n'appartenant ni à \mathcal{D}_1 ni à \mathcal{D}_2 . Le but de l'exercice est de construire un triangle ABC rectangle isocèle en B tel que le point B appartienne à la droite \mathcal{D}_1 et que le point C appartienne à la droite \mathcal{D}_2 .

- 1) Si une telle construction est réalisable, déterminer les similitudes directes de centre A qui transforment B en C . Résoudre alors le problème posé. Combien y a-t-il de solutions ?
- 2) Reprendre l'exercice en supposant les droites \mathcal{D}_1 et \mathcal{D}_2 sécantes.

Exercice n°4

On considère dans le plan trois droites parallèles et distinctes (D_1) , (D_2) et (D_3) . Une droite (Δ) coupe (D_1) , (D_2) et (D_3) respectivement en A , B et C . Soit N un point de (D_2) distinct de B . La parallèle à (NC) passant par B coupe (D_1) en M . La parallèle à (NA) passant par B coupe (D_3) en P .

- 1) Soit h l'homothétie de centre A qui transforme B en C . Construire les points M' et N' images respectives de M et N par l'homothétie h .
- 2) En déduire les images de M et N par la transformation $f = t_{\overrightarrow{NB}} \circ h$
- 3) Montrer que les points M , N et P sont alignés.

Géométrie et groupes

Révisions n°2

- Rappeler la classification des différentes isométries du plan.
- Soit X un espace affine euclidien et Γ une partie non vide de X . Montrer que l'ensemble des isométries f de X telles que $f(\Gamma) = \Gamma$ est un groupe. *Ce groupe est appelé groupe des isométries de Γ .*
- Soit $\Gamma = \{A, B, C, D\}$ l'ensemble des quatre sommets d'un rectangle non aplati $ABCD$. Décrire le groupe des isométries de ce rectangle.

Exercice n°5

Soit ABC un triangle isocèle en A non équilatéral, le but de cet exercice est d'étudier l'ensemble des isométries de \mathcal{P} qui préservent globalement ABC .

- 1) Montrer que cet ensemble est un groupe.
- 2) Montrer que si f préserve ABC alors f fixe l'isobarycentre G de ABC .
- 3) En étudiant les distances GA , GB , GC montrer que $f(A) = A$.
- 4) En déduire (en utilisant la classification des isométries du plan) le groupe des isométries de ABC .

Exercice n°6

Déterminer le groupe d'isométries d'un segment dans le plan euclidien.

Exercice n°7

Déterminer le groupe des isométries du plan affine euclidien laissant globalement invariante la réunion de deux droites strictement parallèles.

Exercice n°8

Soient ABC et $A'B'C'$ deux triangles tels que $AB = A'B'$, $AC = A'C'$, $BC = B'C'$. Combien y a-t-il d'isométries transformant ABC en $A'B'C'$?

Indication : si f et g sont deux telles isométries, alors $f \circ g^{-1}$ est une isométrie conservant ABC .

Exercice n°9

Soit f, g deux isométries du plan affine euclidien \mathbb{R}^2 .

- 1) Montrer que si g et f commutent alors $g = f \circ g \circ f^{-1}$ et f conserve (globalement) l'ensemble des points fixes de g .
- 2) Décrire les cas dans lesquels f et g commutent ($f \circ g = g \circ f$).
- 3) En déduire une description des sous-groupes commutatifs d'isométries.

Exercice n°10

Notons $D \subset \mathbb{R}^2$ une droite affine de \mathbb{R}^2 .

- 1) Montrer que l'ensemble I_D des $g \in Iso(\mathbb{R}^2)$ telles que $g(D) = D$ est un sous-groupe de $Iso(\mathbb{R}^2)$.
- 2) Déterminer les translations qui appartiennent à I_D .
- 3) Montrer que si $g \in I_D$ possède un point fixe alors g a un point fixe sur D .
- 4) Soit $g \in I_D$. Montrer qu'il existe une translation t de I_D telle que $g \circ t$ possède un point fixe.
- 5) Décrire I_D .

Exercice n°11 *(Capes 2020 - Première épreuve)*

A, B, C, D sont les sommets d'un carré du plan \mathcal{P} . On note Q l'ensemble $\{A, B, C, D\}$.

On se propose de déterminer l'ensemble $I(Q)$ des isométries du plan \mathcal{P} qui conservent globalement l'ensemble Q . Parmi elles, $I^+(Q)$ désigne l'ensemble de celles qui sont directes et $I^-(Q)$ l'ensemble de celles qui sont indirectes. La médiatrice du segment $[BC]$ est notée Δ et s_Δ désigne la réflexion d'axe Δ .

- 1) Montrer que $I(Q)$ et $I^+(Q)$ munis de la composition des applications sont des groupes. En est-il de même pour $I^-(Q)$?
- 2) Montrer que l'application $F : I^+(Q) \longrightarrow I^-(Q), f \longmapsto s_\Delta \circ f$ est bijective.
- 3) Démontrer que $I^+(Q)$ contient exactement quatre éléments. Donner la liste de ces éléments et la table du groupe $I^+(Q)$.
- 4) Préciser les caractéristiques géométriques de chacune des isométries de $I(Q)$.

Exercice n°12 *(Capes 2007 - Deuxième épreuve)*

- 1) Soit \mathcal{E} un plan affine euclidien orienté. Soit $p \in \mathbb{N}, p \geq 2$. On appelle groupe diédral d'ordre $2p$, noté D_{2p} , le groupe des isométries laissant invariant un polygone régulier $P_p = \{M_0, \dots, M_{p-1}\}$ à p sommets, parcourus dans le sens direct. On posera $M_p = M_0$.

a) Montrer que le sous-groupe C_p de D_{2p} constitué des isométries directes, est un groupe cyclique d'ordre p engendré par la rotation ρ de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{p}$ où O est le centre du polygone P_p .

b) Préciser une symétrie orthogonale σ laissant le polygone P_p invariant.

c) Montrer que

$$D_{2p} = \left\{ \rho^i \circ \sigma^j; i \in \{0, \dots, p-1\} \text{ et } j \in \{0, 1\} \right\}$$

et en déduire que D_{2p} est un groupe d'ordre $2p$.

d) Soit $k \in \{0, \dots, p-1\}$. Montrer que $\sigma \circ \rho^k \circ \sigma = \rho^{p-k}$.

- 2) Soit G un groupe fini engendré par deux éléments distincts s et s' d'ordre 2. On pose $r = ss'$ et on note p l'ordre de r . On note e l'élément neutre de G .

a) Montrer que G est engendré par r et s .

b) Établir que $sr = r^{-1}s$, puis que $sr^k = r^{p-k}s$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. En déduire que

$$G = \left\{ r^i s^j; i \in \{0, \dots, p-1\} \text{ et } j \in \{0, 1\} \right\}$$

c) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}, s \neq r^k$ (on pourra raisonner par l'absurde et montrer que G serait commutatif, puis que $G = \{e, r\}$). En déduire que G est d'ordre $2p$.


d) Montrer que G est isomorphe à D_{2p} .

1) **Construction d'un pentagone paveur.** Certains trottoirs de la ville du Caire sont pavés de pièces pentagonales non régulières. On s'intéresse à celles dont les cinq côtés ont même longueur.

Dans un repère orthonormé du plan, on considère les points $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$, $B\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$, $C\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ et $D\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.


On construit :

- (C_1) le cercle de centre B et de rayon 1 ;
- (C_2) le cercle de centre C et de rayon 1 ;
- (C_3) le cercle de centre A et de rayon 2 ;
- (C_4) le cercle de centre D et de rayon 2 ;
- E et F les points d'intersection des cercles (C_3) et (C_4) tels que E est d'ordonnée positive ;
- (C_5) le cercle de centre E et de rayon 1 ;
- G_1 et H_1 les points d'intersection de (C_5) avec (C_1) tels que G_1 est d'abscisse négative ;
- G_2 et H_2 les points d'intersection de (C_5) avec (C_2) tels que G_2 est d'abscisse positive.



L'élément de pavage étudié est le pentagone BCG_2EG_1 .

- a) Démontrer que E a pour coordonnées $\left(0; \frac{\sqrt{7}}{2}\right)$.
 - b) Démontrer que l'angle $\widehat{BG_1E}$ est droit.
 - c) Déterminer une équation cartésienne de chacun des cercles (C_1) et (C_5) puis justifier que le point G_1 a pour coordonnées $\left(\frac{-\sqrt{7}-1}{4}; \frac{\sqrt{7}+1}{4}\right)$.
- 2) **Pavage.** On admet que le pentagone construit dans la question 1) permet de paver le plan. Quatre copies du motif pentagonal numérotées 1,2,3,4 ont été mises en évidence sur la figure ci-dessous.



- a) Déterminer une transformation du plan permettant de construire le pentagone 2 à partir du pentagone 1. En préciser les éléments caractéristiques.
- b) Déterminer de même une transformation du plan permettant de construire le pentagone 3 à partir du pentagone 1.
- c) Déterminer de même une transformation du plan permettant de construire le pentagone 4 à partir du pentagone 1.